


ベンチマークを活用したパスの見直し

住友別子病院 看護師 仙波 良典

現状の問題



パスの見直しが必要

眼科病棟



- ・病床数:21床
- ・手術:白内障手術・緑内障手術
硝子体手術・眼瞼下垂 等
- ・手術日:月・水・木・金(火曜日以外)
- ・白内障手術:年間約 1000件
- ・短期入院:入院全体の8割
- ・1日最大15件の入院・手術

実践内容

期間 : 2022年2月20日~2022年9月30日

方法 : 1) 2月~3月

- ①ベンチマーク調査
- ②自部署の指示確認件数と内容調査


2) 3月~8月

- ①医師とベンチマーク内容を検討
- ②白内障パスの見直しとスタッフ指導

3) 9月

- ①パス見直し後の指示確認件数と内容調査
- ②スタッフへの聞き取り調査

白内障手術パスベンチマーク



1年間の抗生剤のコスト




病棟看護師への聞き取り調査



業務の負担感が軽減した
100%

- 術前の抗生剤の点滴が無くなって、**時間に余裕ができた**
- 1人当たりの点眼回数が1回減るだけでも患者がたくさん居るので**負担が減った**
- 点滴がうまく穿刺できなかった時の患者の苦痛な顔を見なくて済むので、**精神的な余裕ができた**

医師への1か月あたりの指示確認回数



(回)


指示簿指示項目の変更

指示:その他	散瞳:診察前 散瞳 左 (狭隅角の場合は散瞳しない)	
	左術前点眼 A/キール・ミドリP・ネオジン・モシロサリンX5 薬入1時間前から	
	持参薬継続	
	両散瞳:前回術後再診なく入院の場合のみ	
	前回術後視力測定未の場合、入院時視力測定して散瞳	指示:安静度 (安静度) 術後30分絶対安静 その後異常なければ安静解除可 病棟内ア-
	手術翌日視力検査	(安静度) OP翌日カッペ除去後院内ア-
	眼圧測定:眼圧 毎日	指示:移動・給食 術後30分は絶対飲食
	眼圧高値で自覚症状がある場合のみ医師報告	指示:便秘・排便回数 便秘時、センソシド 1T~2T
		指示:清潔 入院中は入浴禁。洗顔・洗髪不可 退院後は髪剃り、首から下の入浴は可 退院後医師の指示で開始
		指示:眼圧 眼圧測定:眼圧 毎日
		指示:散瞳 診察前 散瞳 左 (狭隅角の場合は散瞳しない)
		両散瞳:前回術後再診なく入院の場合のみ
		指示:点眼 左術前点眼 A/キール・ミドリP・ネオジン・モシロサリンX5 薬入1時間前から

指示:その他に一括されてきた指示を指示別に変更



まとめ



ご清聴ありがとうございました

