



二次性徴 大人の体 に変化

勃起と射精のしくみ



〈前〉



〈横〉



他人の大事なところ に手を伸ばしたい

- 好きになる

- 近くに居たい

- 長く居たい


- 遅くまで居たい

- きらいでも


- 恥をかかせたい

- 痛いめにあわせたい

- 苦しんでるのを見たい



生理 になると お腹 が 痛い



- 卵胞ホルモンと黄体ホルモンの配合剤(低用量ピル)
 - 生理を減らせば、痛みだけでなく
 - 卵巣がんも減る 貧血も減る イライラも減る

性交渉 感染症 なりやすさ

- 精子 = 乾く = 死ぬ
 - お腹 = ぬるぬる = ぬくぬく
 - 細菌やウイルス・寄生虫
 - 精子と同じで ぬくぬく 長生き
 - 炎症が起こると 入口に
 - 血や膿は ばい菌のベットやミルク
- 粘膜
 - 皮膚よりフワフワ
 - しみこみやすい
 - 傷ができるともっと入りやすい
尖った爪 つめの垢
堅いもの
ゴシゴシ
虫歯



糞口感染 コンドームだけでは 予防できません



- 性器をなめたり触ると、ウンチがクチやユビにつきます
- 肝炎やアメーバが男性同性愛者を通じて大流行



糞口感染 コンドームだけでは予防できません

表. 2015～2017年（過去）と2018年の比較


		2015～2017年 (n=798)	2018年 (n=925)
性別 [%]	男性	61	90
	女性	39	10
年齢 [歳]	中央値 [範囲]	44 [0-99]	37 [2-87]
	男性	ND	37
	女性		47
	推定 感染経路 [%]	経口	74
性的接触		4	53
男性		5	51
女性		1	3

感染症発生動向調査 2019年6月17日現在

A型肝炎の2018年における本邦の流行
台湾(2016年)およびヨーロッパ(2017年)の
男性間性交渉者(MSM)間で流行が報告された
RIVM-HAV16-090株と一致した。



図2. アメーバ赤痢の性別年齢分布, 2007年第1週～2016年第43週



(感染症発生動向調査：2016年11月23日現在報告数)



表1 全数報告の性感染症3疾患における年間報告数と血清陽性率の比較 (2017年)

	年間報告件数 (法令に基づ く全国からの報告)	血清陽性率 (東京都新宿区 内の自発的性感染症 検査場データ*)	自発的性感染症検査場での スクリーニング検査 実施の有無
梅毒	4,572 件 (1位)	2.11% (2位)	あり
HIV 感染症	1,448 件 (2位)	0.34% (3位)	あり
アメーバ赤痢	1,151 件 (3位)	2.64% (1位)	なし

*第32回日本エイズ学会学術集会 P-007 にて報告したデータより抜粋。

性感染症に関する特定感染症予防指針

平成三十年一月十八日 厚生労働省告示第十号

- 梅毒
- 淋菌
- 性器クラミジア感染症
- 性器ヘルペスウイルス感染症
- 尖圭コンジローマ

戦前 1万人あたり11名の失明、新生児淋病16% 先天梅毒8%



梅毒

- スピロヘータ ねじねじ細長い
- 大航海時代🚢に世界中🌐に
- 3週間 唇や性器の潰瘍
- しばらくすると「消える」
- 3カ月 全身のブツブツ 皮疹
- 三年から数十年かけて蝕む
- 何回でも罹る

- 脳や脊髄 マヒや痴ほう
- 動脈が脆く膨れて破れる

- 赤ちゃんも「臓器」

 先天梅毒(‘;’)

目👁️👁️ 見えない


耳👂 聴こえない

歯👄 生えない 骨👤 痛い

脳みそ 考えられない

尖圭コンジローマ＝ヒトパピローマウイルス 子宮頸がん 中咽頭がんのもと

- HPVワクチンの誤解
- 女の子の病気だけを減らすわけではない
- 男の子もなる病気を減らすワクチン



性器クラミジア 感染症

癒着


精子が睾丸から
出られない

精子が卵管を
通れない

受精卵が
卵管に着床
してしまう

肝臓の表面に
マジックテープの
様な癒着が起きる

あちこち
べたべた
くっついて
困る




ヒト免疫不全ウイルス **HIV**

- リンパ球に感染
- リンパ球が減る
- 免疫力が落ちる

広がったのは

- 性行為
- 薬物濫用 
- 売血で作られた血液製剤 



U=U <https://hiv-uujapan.org/>

- 検出されない Undetectable
- 感染させない Untransmittable
- 投薬がなされきちんと内服すると半年以上、HIVが検出され無くなる。
- 出産も含めて普通の人と同じ暮らしができるようになる
- 効果的な治療を継続的に受けウイルス量が検出限界値未満を維持出来ていれば、HIVの性感染リスクはゼロになりますが、HIV以外の他の性感染症（ウイルス性肝炎や梅毒、クラミジア、淋病など）や予期しない妊娠は防ぐことはできません。
- **パートナーを固定する
予防策が大切**

厚木の保健所⁺でも検査[🪡] 046(224)1111 内線3227 HIV・梅毒 B型肝炎とC型肝炎




<https://www.hivkensa.com/>



<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/cnt/f7029/p1034829.html>

- 日本🇯🇵のオリジナルのウイルス
- 母乳🍼の中のリンパ球
- 精液の中のリンパ球
- リンパ球に縫い込まれた遺伝子
- 他人の体に入ると覚醒
- リンパ球を乗っ取る
- 赤ちゃんにうつさない
- 奥さんにうつさない



うんちやおしっこが出にくいくい

- ハム 下肢の麻痺
- 白血病 リンパ腫

「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」

令和2年6月11日の「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」

性暴力の

- 加害者
- 被害者
- 傍観者

にならない

ひとりで悩み、傷ついているあなたへ



かならいんは、性犯罪・性暴力の被害にあわれたあなたをサポートします

相談電話 #8891または045-322-7379

かならいん #8891

かならいんでは、24時間365日いつでも相談を受け付けています。

あなたの不安を解消するため、どうしたらよいか一緒に考えます。

男児も被害者

5%は男性が被害者

児童ポルノ 1割は男児

必ずしも男性は一方向的な加害者ではない

虐めの一環として第三者が強いることもある

「男性及びLGBTs被害者のための専門相談ダイヤル」

相談電話 **045-548-5666**

(毎週火曜日16時～20時 祝休日・年末年始を除く)

児童ポルノの製造

第百八十二条 3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為（第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。）を要求した者（当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。）は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。

二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部（陰茎を除く。）又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位（性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀（でん）部又は胸部をいう。以下この号において同じ。）を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。




クスリ欲しさに 体の関係

クスリを 無理強いしたり

眠らされて イタズラ

<https://www.pref.kanagawa.jp/documents/5794/900095.pdf>



グルーミング

- ゲームを教えてあげる
- スマホを呉れる

- 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 令和5年第211回閣第五八号
 - 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案
<https://www.moj.go.jp/content/001355922.pdf>

居場所が無い

- 泊めてくれる
- お風呂に入れる
- 家に居たくない

【拡散希望】

性暴力をなくそう。

AV出演強要

JKビジネス

レイプドラッグ

酔わせて性的行為を強要

SNSを利用した性被害

セクシュアルハラスメント

痴漢

10代20代に対する性暴力の手口が巧妙になっています。同僚のふいふ性的行為の被害は、いかなる理由・関係性であってもすべて性暴力です。性暴力に関する情報をみんなで共有して、社会全体で性暴力をなくしていきましょう。#NEVER FORGIVE 性暴力

4月1日「若年者の性暴力被害予防月間」

性被害・性暴力でお悩みの方へ
あるたの不安に寄り添いながら支援をする
社会的相談窓口があります。

性被害のお悩み相談窓口
性暴力をなくそう

#8891 #8103

内閣府 / 警視庁 / 消費者庁 / 経済産業省 / 国土交通省 / 文部科学省 / 厚生労働省

改正 刑法（グルーミングの部分）

（十六歳未満の者に対する面会要求等）


第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者（当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。）は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

- 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
- 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
- 三 金銭その他の利益を供与し、
又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

性的同意 予め約束

- なんて抵抗しなかったの？
- 「びっくりして動けない」



えっ？
≠
ハイッ！

Silence is not consent.

yes means yes

- https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html

不同意性交・わいせつ 男性器以外の挿入

第一百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くわう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に

身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する

行為であってわいせつなもの(以下この条及び第一百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

かながわ子ども家庭 110番相談LINE

児童虐待防止のためのLINE相談です



親子関係や家族の悩み、子育ての不安など、
子どもに関わる相談を無料でお受けします。
子どもの皆さんや保護者の方の相談をお待ちし
ています。

対象

県内の子ども、保護者の方

相談時間

月～土曜日 9時～20時（年末年始を除く）

ID

kana_kodomo110

二次元 コード



Q 誰かにプライベートな
ところを触られて
嫌なことはありますか？



プライベートなところ（ほめてかくすところ）は
人に見られたり、触られたりしないんだよ！
家族からもね

ひとり こま でんわ
一人で困ってないで電話してね!

あなたは悪くないんだから

子ども家庭110番 (9:00~20:00)




☎0466-84-7000

児童相談所は、あなたと同じような相談をたくさん受けています。
詳しくは…

児童相談所
虐待対応
ダイヤル





男女共同参画センター かなテラス

女性相談 0466-26-5550

男性相談 0570-033-103

性被害・性暴力で悩んでいる方へ、一人で悩まず、相談してください。

電話で 相談 #8891	SNSで 相談 #8103	QRコード	外見 性暴力に関するSNS検索 (Cure time) (検索ワード)
---------------------------	----------------------------	-------	--

望んだ両性の合意のある妊娠でも、そうではなくても、まず妊娠届

- 望む望ま無いに拘わらず、妊娠したら多くの人の手を借りて、自分の体を護りましょう。
- 妊娠の不安だけでなく、ホルモンバランスなどによる情動の振幅でも、悩みや心の負担が掛かります。
- 市町村・県などの担当者も相談にのります。母子保健の担当だけでなく未成年であれば児童相談所なども相談になります。



生理がこない
妊娠したかも？

どうしよう・・・
相談先が
分からない。

安心して
ご相談ください。

LINE 毎日 16-21時
電話 月、水、金 祝・休日は相談可、年末年始を除く

母子保健法第15条 妊娠届

児童福祉法第6条の3第五項目 特定妊婦

およそ5人から10人に1人が、妊娠中から産後のある段階で「うつ病」といえる状態になっている

(表) 世帯の仕事によって異なる乳児死亡率 (%)

農家	自営業者	常用勤労者(I)	常用勤労者(II)その他	無職
0.31	0.17	0.15	0.09	1.82

(出所) 厚生労働省「人口動態統計」を基に筆者(小林美希)作成

- 望む望ま無いに拘わらず、妊娠したら多くの人の手を借りて、自分の体を護りましょう。
- 妊娠の不安だけでなく、ホルモンバランスなどによる情動の振幅でも、悩みや心の負担が掛かります。

おわり

おまけも読んでね

SOGI

sexual orientation 好きになる性

gender identify 心の性

- 少数派も更に細分化される
- 女装家とMSMは一緒では無い
- MtFとFtMも、好きになる性は個人の気持
- 不時性、気持ちは揺れ動く
- 疎外感がつのと、心が碎け易くなる
- 性的指向や性自認等、性に関する最低限の知識を持ち合わせていないとハラスメントを無意識のうちに行ってしまう危険。
- 勝手に他人に暴露する、同性・異性を問わず、性的指向や性自認に関して性的な言動を行うのはハラスメントにあたる

- <https://www.ipss.go.jp/projects/j/SOGI/>
- 性的指向と性自認の人口学
- https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokusougaiihokenfukushibu/s11_2.pdf
- 性的少数派の心の健康
- https://www.ncnp.go.jp/mental-health/docs/nimh49_sp_27-33.pdf
- 自殺と性別、セクシュアリティ
- <https://www.toben.or.jp/know/iinkai/seibyoudou/column/2022119.html>
- SOGIハラ
- 疎外感やいじめによる心的外傷

どうしてこんな授業を受けるの

- 感染すると慢性的な骨盤内炎症性疾患の原因となりやすい
- 胎児感染や産道感染すると子供に不利益になる。妊娠しにくい体になる
- 性感染症及びその妊娠や母子への影響を性と生殖に関する健康問題として捉える
- 性的虐待や性犯罪等の被害者に対する支援や緊急避妊のための総合的支援が求められる
- 学校における教育においては、学習指導要領に則り、児童生徒の発達段階を踏まえ、保健所等は、教育関係機関及び保護者等と十分に連携し、学校における教育と連動した普及啓発を行う
- 国及び都道府県等は、特に若年層等が性感染症に関して受診しやすい医療体制の整備等の環境作りとともに、保健所等における検査から、受診及び治療に結び付けられる体制作りを推進する

感染症にもいろいろあります

- ヒトを好きになったら、愛着が生じて、距離が近くなります。
- 会話をする時間も増え、飲食を共にしたり、夜遅くまで共に過ごすようになります。
- ソーシャルディスタンスと真逆になります。
- 見知らぬ相手でも性暴力の対象にする悪い人もいます。
- 皮膚よりも守りが弱く、病原体が長生きしやすい粘液が直接触れ合う性行為は、本当だったら簡単に死んでしまうウイルスや細菌も、相手に渡る機会・可能性が高まります。
- 精子なんて乾いたらすぐ死んじゃいます。でも膣から卵管を上るのに数日生き延びます。
- 卵管は腹腔に通じています。

性感染症の種類

性感染症に関する特定感染症予防指針

平成三十年一月十八日 厚生労働省告示第十号

- 本指針の対象である
- 性器クラミジア感染症
- 性器ヘルペスウイルス感染症
- 尖圭コンジローマ
- 梅毒
- 淋菌感染症
- 性的接触を介して感染することがある感染症は、HIV感染症・エイズ、B型肝炎を含め多数あることに留意する必要がある、本指針に基づく予防対策は、これらの感染症の抑制にも資するものと期待される。

HTLV-Ⅰ ヒト成人T型リンパ性白血病ウイルスI

- HTLV-1は逆転写酵素活性がありヒトの遺伝子に組み込まれる能力のあるウイルスです。
- 感染する力はエイズを起こすHIVよりさらに弱いです。
- このウイルスが人から人にうつるためには、キャリアの持つHTLV-Ⅰ感染細胞が生きたまま大量に人の体に入ることが必要です。
- 一番の感染経路は、おっぱいです。
- 乳汁の中にはリンパ球も含まれます。
- リンパ球の中に包まれたHTLV-1のウイルスが免疫の働きの弱い乳児に感染し、数十年体の中で増える内に千人に1件位の確率で血液の癌を起こします。
- 大人同士の性交渉では精液を注ぎ込まれる側に非対称的に感染が起こります。精液の中のリンパ球の中のHTLV-1ウイルスが相手に感染します。
- 大人になってからは血液のがんは起こりにくいです。その前に寿命になってしまうからです。でも、脊髄炎で膀胱直腸の麻痺をおこしたり下肢の麻痺をおこしたり、ぶどう膜炎と言って眼の炎症を起こす場合があります。

性病では無い、慢性持続性感染と初感染

- 伝染性単核球症
- Kissing Disease
- 子どものころに罹るEBウイルス
- 症状が無いまま唾液に出る
- 子どものころに罹らずに思春期を過ぎて掛かると、白血病に見誤る単核球症や肝炎が起こる
- TORCH症候群
- トキソプラズマ(猫などの寄生虫)やサイトメガロウイルスなどいろいろな病原体が胎児感染を起こした場合、胎児に病気が起こる。
- 妊娠中の最初の感染だけでなく潜伏感染していると、あるいは上の子からの再感染でも胎児に病気が起こることがある。

「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、 子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう

令和2年6月11日の「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」

- まず虐めを含めた加害者にならないようにしましょう
- 見たり聞いたりしたときは、いろいろな立場の人たちと手を携えて、支えましょう
- 被害者になったときは、周囲に知られたくないこともあるでしょう。相談にのってくれる行政の窓口は幾つかあるので、調べてみましょう。

ひとりで悩み、傷ついているあなたへ



かならいんは、性犯罪・性暴力の被害にあわれたあなたをサポートします

相談電話 #8891または045-322-7379

かならいんでは、24時間365日いつでも相談を受け付けています。

あなたの不安を解消するため、どうしたらよいか一緒に考えます。

性犯罪・性暴力の被害にあわれた男性やLGBTsのかたへ

被害にあうのは女性とは限りません。

誰にも言えず苦しい思い、つらい思いをしていたら、まずはお電話ください。専門相談員が対応します。

「男性及びLGBTs被害者のための専門相談ダイヤル」


相談電話 045-548-5666（毎週火曜日16時～20時 祝日・年末年始を除く）

「#8103」は、全国共通の番号で、発信場所を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話に繋がります。

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html

生理になるとお腹が痛い


- プロスタグランジン(PG)
- 内膜を子宮の外に押し出すのが月経
- 分娩と似た仕組みで子宮内膜でPGが産生されPGが子宮を強く収縮させる
- 痛み止めはPGの合成を抑える
- 痛い時呑むよりもPGを沢山作り過ぎないように時期を識りながら予め呑んで不必要な子宮収縮に起因する痛みが生じないようにする



卵胞ホルモンが
卵子を育てる

黄体ホルモンが内膜を育てる

プロスタグランジンが子宮を収縮する



- 卵胞ホルモンと黄体ホルモンの配合剤(低用量ピル)
- 21世紀に入ってから毎月月経を起こさせない内服方法
- 最長で120日連続内服する、年に3~4回だけ月経を経験する内服製剤も上市されている
- 子宮内膜の肥厚を抑えて、痛みのもとになるPGの産生も減らす、排卵回数が減れば、排卵時痛も減る。
- 卵管を逆流して骨盤内に播種する内膜の回数も量も減るので、大人になってからの子宮内膜症や子宮筋腫による不妊などの問題も少なくなる
- 排卵に伴い自分が作る女性ホルモン量の変動も穏やかになるので「イライラ、眠気、不眠、気分の落ち込み」などの月経前症候群を穏やかにすることもできる。
- 貧血(回数が減れば喪われぬ)、筋腫も予防できる