

薬剤関連PMLの治療(主なもの)

研究分担者： 埼玉医科大学総合医療センター神経内科 野村 恭一

分類	薬剤
糖質コルチコイド	全て
アルキル化薬	Cycrophosphamide, Dacarbazine, Camstine
プリン代謝拮抗薬	Fludarabine, Azathioprine, Cladribine, Nelarabine
葉酸代謝拮抗薬	Methotrexate
抗体医薬品	Natalizumab, Infliximab, Adalimumab, Muromonab-CD3, Bevacizumab, Basiliximab, Efalitumab, Belimumab, Rituximab, Etanercept, Cetuximab, Brentuximab vedotine, Ibritumomab, Abatacept, Alemtuzumab, Obinutuzumab
免疫抑制薬	Cyclosporine, Sirolimus, Tacrolimus, Mitoxantrone, Mycophenolate mofetil
その他	Diaphenylsulfone, Fumaric acid ester, Fingolimod, Vincristine

解説

1. 薬剤関連PMLを発生する可能性のある医薬品を表1に示す
2. Natalizumab関連PMLの治療
薬剤中止と血液浄化療法(PP)
3. Fingolimod関連PMLの治療
治療は薬剤投与の中止
塩酸メフロキン, ミルタザピンによる有効性の報告がある
4. 無症候性PMLの段階で治療を開始することが望まれる
PPは免疫再構築症候群を来し, 機能障害が増悪する可能性がある